

# バセドウ病アイソトープ治療(甲状腺内用療法) スケジュール

日	月	火	水	木	金	土
-3週				(検査の2週間前) ●ヨード制限食開始 (別紙:治療用ヨード制限食参照) 		
-2週				(検査の1週間前) ●メルカゾール服用中止開始  投与されたアイソトープが、有効に甲状腺に集まるようにするために必要です。		
-1週				①検査(薬内服) (治療のためのアイソトープの投与量を決めるための検査です)	②検査(撮影)	
0週	③治療日(薬内服) 摂取率の数値に合わせて服用する量が決まります。1錠ですむ場合や2~3錠の場合があります。1回の服用ですみます。	④治療後検査(測定)		⑤治療後検査(測定)	⑥治療後検査(測定)	
	(アイソトープが、どれくらい甲状腺に取り込まれたか判定するための検査です。治療の有効性を調べます)					
1週						
2週					(治療終了後2週間後) ●古賀総合病院受診(採血) 採血の結果で薬の量を決めます。	
<b>会計</b> 一連の検査・治療代 概算 1割: ¥10,000 2割: ¥20,000 3割: ¥30,000 *追加の検査及び治療が発生した場合はこの限りではありません。 治療開始後、4ヶ月間、月1回に限り『放射性同位元素内用療法管理料』として診察料以外に 1割: ¥1,390 2割: ¥2,780 3割: ¥4,170 を請求させていただきます。						

2023年10月 古賀総合病院

※ ①~⑥ は、古賀総合病院に受診して頂きます。放射線科より**指示された時刻**に**毎回受診**します。

効果発現までの期間 : 3~6週 自覚所見改善、甲状腺ホルモン低下 4~6週 甲状腺腫の縮小 3~4ヶ月 最大効果 ※ 個人差があります。